



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

## Vacuna Viva

Para la inmunización de aves contra  
la Bronquitis Infecciosa Aviar

Reg. SENASA:  
03-301



### Composición

**CEVAC® BRON 120 L** contiene la cepa Massachusetts H120 del virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar en forma activa y liofilizada. Los huevos embrionados empleados en la elaboración de la vacuna se obtienen de aves libres de patógenos específicos (SPF).



### Indicaciones

**CEVAC® BRON 120 L** se recomienda para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa. La vacuna puede emplearse para la vacunación inicial o la revacunación de pollos, pollitas y gallinas.



### Administración y dosis

La primovacunación puede realizarse con **CEVAC® BRON 120 L** por vía ocular o por el método de aspersión desde el primer día de edad. Se recomienda la revacunación por aspersión o en el agua de bebida tres a cuatro semanas posteriores a la primovacunación. Para pollitas de reemplazo una segunda revacunación es recomendada entre las 10 y 12 semanas de edad.



### Advertencias y Almacenamiento

- Esporádicamente síntomas respiratorios catarrales pueden aparecer de 4 a 6 días después de la vacunación pero desaparecen en pocos días.
- Almacenar la vacuna entre 2°C y 8°C protegida de la luz.



### Presentación

- Viales de 2.500 y 5.000 dosis.

Ceva es una marca registrada y/o autorizada por Ceva Salud Animal S.R.L.  
Cevac® Bron 120 L es una marca registrada y/o autorizada por Ceva Sante Animale.

#### Ceva Salud Animal S.R.L.

Camila O'Gorman 412, 12° Piso (C1107DED) Buenos Aires - Argentina  
Tel. +54 11 3724 7700  
[www.ceva.com.ar](http://www.ceva.com.ar)



@CevaArgentina



Ceva Salud Animal Argentina



Juntos, más allá de la Salud Animal