

IMMUCOX 5[®]

Vacuna oral contra la coccidiosis

Para la inmunización contra la coccidiosis
Ooquistes vivos de *Eimeria* spp.

Reg. SENASA N°:
19-052



Composición

IMMUCOX 5[®] está diseñada con el propósito de proporcionar dosis bajas uniformes de ooquistes vivos a los aves para ayudarlos en el desarrollo de inmunidad contra la coccidiosis. Cuando se administra de acuerdo a las direcciones (ver abajo) **IMMUCOX 5[®]** puede prevenir la mortalidad atribuible a la coccidiosis.

- Ingredientes Activos: *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. necatrix* Y *E. brunetti*.



Indicaciones

- Para 10,000 dosis de **IMMUCOX 5[®]** Gota de gel:
- Añadir 70g del gel diluyente en spray a 2.5 l de agua destilada. Mezclar bien en una licuadora.
 - Agitar bien 10,000 dosis de la vacuna **IMMUCOX 5[®]**, y verterlas en un recipiente plástico para batir con licuadora manual.
 - Vacunar los pollitos de 1 día de edad (eclosión) a 3 días de edad, a razón de 25 ml por cada 100 aves, utilizando Desvac In-Line Dúo Spray & Gel para aplicación en gel, utilizando una máquina o dispositivo aplicador de gota de gel.



Administración y dosis

- Aplicación en gota de gel.
- Pollitos de 1 a 3 días de edad.
- La aplicación de gota de gel mantiene a los ooquistes en suspensión durante la aplicación, previniendo la sedimentación de los ooquistes y facilitando una toma uniforme de todas las especies incluidas en la vacuna.



Advertencias y Almacenamiento

- Asegúrese de no utilizar un anticoccidial (coccidiostático) en el alimento. Incluso un nivel bajo de un anticoccidial puede reducir o anular la efectividad de la vacuna.
- Los antibióticos de amplio espectro que poseen actividad anticoccidial (por ejemplo, tetraciclinas, sulfamidas y nitrofuranos) no deberán utilizarse junto con **IMMUCOX 5[®]** durante los primeros 16 días después de la vacunación.
- No administrar dosis mayores o menores a la dosis recomendada.
- Si las aves se encuentran alojadas en un espacio confinado (por ejemplo, el área de cría), deberán ser liberadas del confinamiento al sexto día de la vacunación, o el área nueva deberá ser por lo menos el doble de tamaño del área donde se alojaban al momento de la vacunación.
- Almacenar entre 2-8°C. No congelar.



Presentación

- Caja conteniendo frascos de 1.000 dosis.

Cevac[®] IMMUCOX[®] 5 es una marca registrada y/o autorizada por Biomune Company.

Ceva Salud Animal S.R.L.

Camila O'Gorman 412, 12º Piso (C1107DED) Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 3724 7700
www.ceva.com.ar



@CevaArgentina



Ceva Salud Animal Argentina



ceva_argentina



Juntos, más allá de la Salud Animal